

Pertussis is a very contagious respiratory disease commonly known as whooping cough.

The disease is caused by a type of bacteria called *Bordetella pertussis* which is usually spread by coughing or sneezing from person to person while in close contact.

Pertussis can cause serious illness in infants, children and adults and can be life-threatening.

What is Pertussis?

What is the best way to prevent pertussis?

CDC Recommends:

For maximum protection against pertussis, children should receive 5 DTaP shots:

- Shots 1-3 given at 2, 4 and 6 months of age
- Shot 4 should be given between 15 and 18 months of age
- Shot 5 should be given before entering school at 4-6 years of age
- Administer 1 dose of Tdap vaccine to all adolescents aged 11 through 12 years.
- Tdap can be administered regardless of the interval since the last tetanus and diphtheria toxoid-containing vaccine.
- Pregnant women should receive a Tdap vaccination between the 27th and 36th week of each pregnancy which will create protective antibodies, passing some of the antibodies to the baby prior to birth.
- Pregnant women who have not been previously vaccinated with Tdap should receive one dose of Tdap postpartum before leaving the hospital.

Adults 65 years of age and older who have close contact with infants should also receive Tdap as well as caretakers and healthcare providers.



Dallas County Health and Human Services

2377 N. Stemmons Fwy., Dallas, TX 75207

www.dallascounty.org/hhs | (214) 819-2000

La pertusis es una enfermedad respiratoria muy contagiosa conocida comúnmente como tos ferina.

La enfermedad es producida por un tipo de bacteria denominada *Bordetella pertussis*, la cual **se propaga usualmente al toser o estornudar** de una persona a otra al estar en contacto cercano. La tos ferina **puede producir una enfermedad grave en los infantes, niños y adultos y puede poner en riesgo la vida.**

¿Qué es la pertusis?

¿Cuál es la mejor forma de evitar la tos ferina?

CDC recomienda:

Para una máxima protección contra la tos ferina, los niños deben recibir cinco inyecciones de DTaP:

- Las inyecciones 1-3 deben darse a los 2, 4 y 6 meses de edad
- La inyección 4 debe darse entre los 15 y 18 meses de edad
- La inyección 5 debe darse antes de ingresar a la escuela a los 4-6 años de edad
- Administre 1 dosis de vacuna Tdap a todos los adolescentes de 11 a 12 años de edad.
- Tdap puede administrarse independientemente del intervalo desde la última vacuna contra tétanos y difteria que contenga toxoides.
- Las mujeres gestantes deben recibir una vacuna de Tdap entre las semanas 27 y 36 de cada embarazo, la cual creará anticuerpos de protección, pasando algunos de éstos al bebé antes de nacer.
- Las mujeres gestantes que no han sido previamente vacunadas con Tdap deben recibir una dosis de Tdap después del parto, antes de dejar el hospital.

Los adultos de 65 años de edad y mayores que tienen contacto cercano con infantes también deben recibir Tdap, así como los encargados del cuidado y médicos.



Servicios Humanos y de Salud del Condado de Dallas

2377 N. Stemmons Frwy., Dallas, TX 75207

www.dallascounty.org/hhs | (214) 819-2000